



AZIENDA USL DI FERRARA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale
di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere
(cat. D) per esigenze dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara**

PROVA SCRITTA 03

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

1 Il Codice Deontologico prevede che l'infermiere agisca:

- A** in base al proprio livello di competenza e collaborando attivamente solo con i professionisti della propria azienda ospedaliera
- B** ricorrendo sempre alla consulenza di infermieri esperti o specialisti
- C** in base al proprio livello di competenza e ricorra, se necessario, alla consulenza di infermieri esperti o specialisti
- D** solo in base al proprio livello di competenza, senza chiedere alcuna consulenza

2 La posizione più idonea per la somministrazione di un clistere evacuativo a piccolo volume è:

- A** genupettorale
- B** laterale destra con ginocchio sinistro flesso (posizione di Simd)
- C** laterale sinistra con ginocchio destro flesso (posizione di Sims)
- D** prona

3 Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, la percussione:

- A** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
- B** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
- C** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area, al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
- D** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio

4 In base al d.P.C.M. 29/11/2001, quale delle seguenti prestazioni NON è inclusa nei LEA?

- A** Programmi di riabilitazione e reinserimento a favore di tossicodipendenti per tutta la fase della dipendenza
- B** Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale
- C** Prestazioni a domicilio di medicina generale
- D** Chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite

5 Nel caso di schizzo con materiale biologico in congiuntiva è indicato lavare:

- A** abbondantemente con acqua, soluzione fisiologica e amuchina al 10%
- B** con acqua e sapone disinfettante
- C** con acqua e sapone detergente
- D** abbondantemente con acqua corrente

6 Quali dati devono essere registrati per un paziente che esegue dialisi peritoneale in regime ambulatoriale?

- A** Il numero e gli orari degli scambi giornalieri, i valori della creatinemia, il peso corporeo solo dopo l'esecuzione dello scambio
- B** Il numero degli scambi giornalieri, il colore e la qualità del liquido drenato, il peso corporeo, i valori glicemici rilevati sul liquido peritoneale per escludere la possibile insorgenza di peritonite
- C** Lo stato della medicazione, la presenza di anuria e valori glicemici
- D** Il numero e gli orari degli scambi giornalieri, il tipo di dialisato, il colore e la qualità del liquido drenato, il peso corporeo prima e dopo ogni scambio dialitico, lo stato del punto di inserzione del catetere e il tipo di medicazione dello stesso

7 Il lavaggio delle mani mira specificamente a prevenire:

- A** la trasmissione di tutti gli agenti virali
 - B** la trasmissione delle malattie infettive ematologiche
 - C** le infezioni ospedaliere
 - D** le infezioni respiratorie
-

8 Quale tra i seguenti NON è un sintomo di meningite?

- A** Spasticità diffusa
 - B** Nausea e vomito
 - C** Rigidità nucale
 - D** Letargia
-

9 Che comportamento deve adottare un infermiere che segue un paziente dializzato non aderente alla terapia nutrizionale?

- A** Assumere un atteggiamento giudicante e duro
 - B** Assumere un atteggiamento passivo
 - C** Promuovere e rinforzare l'educazione sanitaria continua, assumendo un atteggiamento incoraggiante
 - D** Assumere un atteggiamento indifferente
-

10 In caso di trauma cranico subito da un bambino, quali segni/sintomi possono far sospettare la commotività dello stesso?

- A** Diminuzione del senso di appetito
 - B** Comparsa di gonfiore ed ematoma sul punto di azione del trauma
 - C** Pianto inconsolabile nei primi minuti dopo il trauma
 - D** Comparsa di vomito "a getto"
-

11 Il d.lgs. 81/2008 riguarda:

- A** la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - B** la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale
 - C** la gestione dei rifiuti sanitari
 - D** l'integrazione dei servizi sociali all'interno del Servizio Sanitario Nazionale
-

12 La flebite chimica è una complicanza della somministrazione farmacologica per via endovenosa provocata principalmente da infusione di farmaci e soluzioni irritanti. A cosa deve fare maggiore attenzione l'infermiere, quando il pH e l'osmolarità della soluzione endovenosa che sta iniettando differiscono da quelli del sangue?

- A** Assicurarsi che il paziente non accusi dolore o bruciore al passaggio del farmaco
 - B** Assicurarsi che il tessuto circostante non sia edematoso
 - C** Assicurarsi che il punto di inserzione del catetere venoso periferico non sia arrossato
 - D** Assicurarsi che il paziente non avverta gonfiore circostante al catetere venoso periferico al passaggio del farmaco
-

13 In caso di necessità di monitoraggio del bilancio idro-elettrolitico in una donna non collaborante e con incontinenza urinaria totale, quale sarà l'intervento infermieristico più appropriato?

- A** Posizionamento di pannolone o altro presidio assorbente
- B** Cateterismo vescicale estemporaneo
- C** Cateterismo vescicale a permanenza
- D** Rilevazione oraria della pressione arteriosa e concomitante rilevazione del peso del pannolone

14 La scala di Braden, usata per valutare il rischio di lesioni da pressione, prende in considerazione:

- A** l'idratazione
- B** la presenza di malattie cardiovascolari
- C** la presenza di disturbi psichiatrici maggiori
- D** il grado di esposizione della pelle all'umidità

15 Uno dei problemi nutrizionali più importanti in gravidanza è la carenza di:

- A** vitamina B₁₂
- B** tiamina
- C** proteine
- D** acido folico

16 Nell'assistere un paziente nel postoperatorio si deve ricordare che il dolore può essere influenzato:

- A** dall'ora di esecuzione dell'intervento chirurgico
- B** dalla sede e dalla durata dell'intervento chirurgico
- C** dal tipo di antisettico utilizzato per la preparazione cutanea
- D** dalla durata del digiuno preoperatorio

17 I tempi di digiuno preoperatorio, nel bambino e nell'adulto, per l'assunzione di latte vaccino, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:

- A** 6 ore
- B** 20 ore
- C** un'ora
- D** 30 minuti

18 Gli accertamenti iniziali per il tumore della mammella prevedono le seguenti indagini diagnostiche:

- A** Ecografia; PET (Tomografia ad Emissione di Positroni); RX Torace
- B** RM; autopalpazione; RX Torace
- C** TC; mammografia; galattografia
- D** Mammografia; Ecografia; Agoaspirato

19 Qual è la tecnica utilizzata per il cateterismo vasale in corso di arteriografia?

- A** Seldinger
- B** Bloomberg
- C** Liechtenstein
- D** Doppler

20 Nell'assistenza a una persona diabetica, quali segni/sintomi possono far sospettare all'infermiere un'ipoglicemia lieve?

- A** Sudorazione, tremore, tachicardia
 - B** Disorientamento, convulsioni, difficoltà a svegliarsi
 - C** Sudorazione, aumento della temperatura, tachipnea
 - D** Disorientamento, tremore, bradicardia
-

21 La glicemia a digiuno nel soggetto sano ha valori:

- A** inferiori a 40 mg/dl
 - B** compresi tra 80 e 150 mg/dl
 - C** compresi tra 60 e 110 mg/dl
 - D** superiori a 150 mg/dl
-

22 I farmaci antelmintici sono impiegati:

- A** per contrastare il vomito
 - B** nel trattamento delle parassitosi intestinali
 - C** per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue
 - D** per la regolarizzazione della secrezione biliare
-

23 L'esame dell'urinocoltura:

- A** fornisce informazioni sull'eventuale presenza di microrganismi potenzialmente responsabili di infezioni delle vie urinarie
 - B** è un test che ha come finalità quella di testare gli antibiotici più efficaci nei confronti dei microrganismi identificati
 - C** è un test che fornisce informazioni su colore, pH, peso specifico, presenza o assenza di globuli bianchi
 - D** tutte le altre alternative sono corrette
-

24 In un paziente in decubito laterale obbligato, le lesioni da decubito si possono formare in corrispondenza di:

- A** orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli
 - B** orecchio, coste, tuberosità ischiatica
 - C** zigomi, scapole, gomiti, talloni
 - D** osso parietale, cresta iliaca, malleoli
-

25 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire la disidratazione?

- A** Somministrare acqua ogni 2 ore e infondere la dieta a velocità rapida
 - B** Somministrare acqua ogni 4-6 ore, sostituire la dieta con una a osmolarità maggiore e valutare il bilancio idrico
 - C** Somministrare acqua ogni 4-6 ore e, alla fine di ogni pasto, valutare il bilancio idrico
 - D** Somministrare acqua alla fine di ogni pasto e pesare il paziente una volta al giorno
-

26 Nell'approccio terapeutico al paziente con linfedema, NON risulta indicato/a:

- A** l'igiene dei piedi
 - B** la profilassi antibiotica
 - C** l'uso di FANS
 - D** l'uso di calze elastiche a contenimento graduato
-

27 Se un infermiere commette un errore durante il turno di lavoro in ospedale e ne deriva una lesione, e quindi un danno al paziente, in ambito penale:

- A** pagheranno in parti uguali l'assicurazione dell'ospedale e quella dell'infermiere
- B** risponderà il medico responsabile della struttura ove lavora l'infermiere
- C** l'infermiere risponderà personalmente di quanto derivato
- D** il danno residuo verrà pagato dall'assicurazione dell'ospedale

28 La medicazione a base di enzimi proteolitici è indicata per le lesioni:

- A** con modesto essudato
- B** con abbondante essudato
- C** necrotiche o con presenza di fibrina
- D** al primo stadio

29 Il polso radiale si rileva:

- A** appoggiando il pollice al centro del polso dell'assistito
- B** con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, esercitando una lieve pressione in particolare con il dito distale
- C** con le tre dita centrali in opposizione al pollice, così da stringere il polso della persona
- D** con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, esercitando una lieve pressione in particolare con il dito prossimale

30 Quale posizione deve assumere un assistito durante la manovra di posizionamento di un drenaggio toracico?

- A** Posizione di Trendelenburg
- B** Decubito laterale sinistro
- C** Decubito supino o semi-seduto
- D** Decubito prono

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 La temperatura corporea misurata per via rettale:

- A** risulta maggiore di 0,5 °C rispetto a quella ascellare
- B** risulta minore di 0,3 °C rispetto a quella orale
- C** necessita di un tempo di misurazione di 5 minuti
- D** risulta maggiore di 3 °C rispetto a quella ascellare

32 Quale, tra i seguenti organi del SSN, eroga prestazioni di ricovero e cura?

- A** ISS
- B** USMAF
- C** IRCCS
- D** INAIL

Selexi Srl ©

