

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA (CAT. D)
INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**

PROVA SCRITTA N. 1

1 - Quale di questi fattori non è associato allo sviluppo di nausea e vomito in gravidanza?

- a) Aumento della massa placentare come gravidanza gemellare le gravidanze complicate da mola vescicolare
- b) Storia di iperemesi nelle gravidanze precedenti.
- c) Storia di cinetosi (mal d'auto, mal di mare...).
- d) Poliabortività

2 - Il fattore prognostico più importante nei tumori ovarici è:

- a) la monolateralità della lesione
- a) età
- b) malattia residua all'intervento
- c) nessuna delle risposte indicate

3 - Un utero costituito da due corni nettamente separati che si continuano in due colli e sboccano in un'unica vagina è un utero:

- a) setto con vagina unica
- b) didelfo
- c) subsetto arcuato
- d) nessuna delle citate

4 - La Vaginosi Batterica (BV) si associa con:

- a) Infezioni ricorrenti delle vie urinarie
- b) Infezioni postpartum
- c) Complicanze ostetriche
- d) Tutte le precedenti

5 - Quale di queste affermazioni è corretta?

- a) Il 2-5% delle donne non diabetiche sviluppa in gravidanza una forma temporanea di diabete "diabete gestazionale"
- b) Nel 90% dei casi il diabete insorge per la prima volta in gravidanza (diabete gestazionale).
- c) Nel 10% è pre-esistente alla gravidanza (diabete pregravidico).
- d) Tutte corrette

6 - Quale di queste affermazioni è esatta?

- a) I batteri sono più numerosi delle cellule umane rapporto 10:1
- b) I geni nel nostro microbioma sono più numerosi dei geni nel nostro Genoma rapporto 100 a 1
- c) Tutte esatte
- d) Esistono oltre 1000 specie batteriche diverse

7 - In Italia la prevalenza dei difetti del tubo neurale sul feto, in una gravidanza senza fattori di rischio, è:

- a) 1/1000
- b) 1/100
- c) 1/1500
- d) 1/10000

8 - In Italia donne che hanno già avuto due figli affetti da Difetti del Tubo Neurale (DTN) il rischio di DTN è:

- a) 1 su 30 nati
- b) 1 su 10 nati
- c) Non è valutabile
- d) 1 su 40/50 nati



Nicola Bolchini
Benedetta...

9 - Per la rilevazione dei fattori di rischio psicosociali e di depressione post-partum (domande di Whooley), quando in un colloquio si registrano reticenze a seguito di alcune domande è opportuno:

- a) Riproporre con insistenza la domanda e non procedere sin che non si è avuta risposta
- b) Registrare la reticenza e riaffrontare il tema successivamente
- c) Mantenere un atteggiamento interessato ed empatico
- d) b + c

10 - All'interno di un servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), quale strumentazione è presente in una sala criobiologica?

- a) Contenitori criobiologici (dewar) per conservazione materiale biologico in condizioni di temperatura controllata
- a) Contenitori non criobiologici con caratteristiche indefinite
- b) Container di sterilizzazione
- c) Tutte le precedenti

11 - L'onset time (o inizio tempo di azione) dell'ossitocina è:

- a) 2-3 minuti
- b) 5-6 minuti
- c) 8-9 minuti
- d) Nessuna delle precedenti

12 - In caso di Pap test LSIL (lesione intraepiteliale squamosa di basso grado):

- a) è sempre presente una lesione da virus HPV (Human papilloma virus)
- b) è sempre presente una displasia di grado lieve
- c) essendo una lesione lieve può regredire spontaneamente
- d) è sempre necessario nel vecchio e nuovo protocollo effettuare altri accertamenti

13 - Nella donna con diabete gestazionale, il numero dei pasti che è consigliabile fare nella giornata è:

- a) non più di 3
- b) 5-6 pasti
- c) più di 6 pasti
- d) 4 pasti

14 - Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di:

- a) penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione
- b) penna indelebile, ed in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la richiesta nella pagina successiva
- c) penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto
- d) penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo a fianco la richiesta corretta

15 - Quando si ritiene necessario inviare la donna ad altri professionisti facenti parte della rete della diagnosi prenatale, è preferibile:

- a) informare preventivamente i colleghi che dovranno approfondire la situazione di quanto già comunicato alla donna e le eventuali sue reazioni
- b) argomentare e far leva sul senso di responsabilità per il bene del bambino
- c) affiancare la donna nel decidere a quali professionisti rivolgersi per eventuali approfondimenti, restando a disposizione per rivederla e operare eventuali altre scelte.
- d) dare per scontato un percorso "ovvio" per il professionista senza ascoltare, accogliere le intenzioni della donna

16 - Quali fattori condizionano il successo/insuccesso dell'induzione del travaglio di parto?

- a) Parità, epoca gestazionale, peso fetale, etnia, età materna e *Body Mass Index (BMI)* o Indice di Massa Corporea (IMC) della madre
- b) Esclusivamente il BMI della madre e l'epoca gestazionale
- c) Esclusivamente la parità ed il BMI della madre
- d) Nessuna delle precedenti

17 - La colestasi gravidica

- a) È una patologia multifattoriale specifica del secondo e terzo trimestre della gravidanza
- b) È caratterizzata da prurito generalizzato soprattutto notturno
- c) È caratterizzata da un aumento del livello sierico degli acidi biliari e/o una generica alterazione della funzione epatica in assenza di altre patologie epatiche specifiche o dermatologiche sottostanti
- d) Tutte le precedenti

18 - In caso di gravidanza bigemina bicoriale biamniotica

- a) È raccomandato il taglio cesareo elettivo a 36 settimane di gestazione
- b) È raccomandato il taglio cesareo elettivo dalla 34[°] settimana di gestazione
- c) È raccomandato il parto elettivo (induzione del travaglio o taglio cesareo se indicato) da 37 a 37 settimane + 6 giorni di gestazione
- d) È sempre indicato il taglio cesareo elettivo

19 - L'esercizio fisico in gravidanza

- a) Determina una riduzione di circa il 30% dell'incidenza di diabete gestazionale
- b) È controindicato nelle pazienti obese o in sovrappeso
- c) Incrementa l'incidenza di taglio cesareo e/o parto operativo
- d) Incrementa l'incidenza di preeclampsia

20 - L'accrescimento placentare è una condizione caratterizzata da

- a) Anomala adesione della placenta alla parete uterina
- b) Impianto placentare in corrispondenza del SUI
- c) Impianto placentare a meno di 20 mm dall'OUI
- d) Nessuna delle precedenti

21 - L'indice di Apgar considera i seguenti parametri

- a) Frequenza cardiaca, respirazione, pH, tono muscolare, riflessi, colorito
- b) Respirazione, frequenza cardiaca, tono muscolare, riflessi, pH
- c) Respirazione, frequenza cardiaca, lattati, tono muscolare, colorito
- d) Frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare, riflessi, colorito

22 - Le disfunzioni neurologiche a breve termine causate da ipossia/acidosi intrapartum vengono identificate con il quadro di encefalopatia ipossico-ischemica (HIE). Per porre diagnosi di HIE sono necessari:

- a) La conferma di acidosi metabolica intrapartum, indice di apgar persistentemente basso
- b) Evidenze precoci all'imaging di edema cerebrale
- c) La comparsa di segni precoci, come cambiamenti nel tono muscolare, nei movimenti di suzione, convulsioni o coma nelle prime 48 h di vita
- d) Tutte le precedenti

23 - Quale fra i seguenti NON è un sintomo attribuibile ad un quadro di possibile prolasso genitale:

- a) sensazione di corpo estraneo in vagina
- b) defecazione ostruita
- c) dolore addominale basso
- d) dismenorrea

24 - Si osservano più riflessi innati nel bambino quanto la madre:

- a) È distesa orizzontalmente sul letto
- b) È seduta diritta sulla sedia
- c) È in posizione semireclinata
- d) Usa la posizione a rugby per attaccare il bambino

25 - Dal 2012 il programma di screening in Italia prevede:

- a) Pap test come test di screening primario nelle donne della fascia 30/34-64 anni ogni 3 anni
- b) Test HPV come test di screening primario nelle donne della fascia 30/34-64 anni ogni 5 anni
- c) Test HPV come test di screening primario nelle donne della fascia 25-30/34 anni ogni 5 anni
- d) Cotest come test di screening primario nelle donne della fascia 30/34-64 anni ogni 5 anni

26 - L'adesione al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina:

- a) Riguarda solo i liberi professionisti.
- b) È volontaria.
- c) È obbligatoria per tutti i professionisti sanitari
- d) È obbligatoria solo per medici ed ostetriche

27 - Quali eventi si possono segnalare con l'incident reporting:

- a) solo gli incidenti potenziali
- b) solo gli incidenti che provocano danni significativi
- c) qualunque accadimento che ha o avrebbe potuto causare un danno
- d) tutte le precedenti

28 - Secondo l'attuale giurisprudenza, quando viene esercitato il potere disciplinare dell'Ordine sulle proprie ostetriche/i iscritte/i?

- a) Viene esercitato sul comportamento del sanitario solo in ambito professionale
- b) L'Ordine non ha alcun potere disciplinare sulle proprie iscritte/i.
- c) Viene esercitato sul comportamento del sanitario sia in ambito professionale che nella vita privata
- d) Viene esercitato sul comportamento del sanitario sia in ambito professionale che nella vita privata ma solo per i liberi professionisti

29 - Che cosa significa "Mediazione Culturale"?

- a) Mediare tra documenti diversi
- b) Negoziare tra persone di diverso sesso
- c) Negoziare tra strutture di culture diverse
- d) Garantire la comprensione dei contenuti dell'informazione a persone di cultura diversa

30 - La responsabilità delle singole annotazioni contenute nella cartella clinica è da attribuirsi:

- a) Al direttore di Dipartimento
- b) Al direttore dell'Unità Operativa
- c) A coloro che le hanno effettuate
- d) Al coordinatore

8 - In Italia donne che hanno già avuto un figlio affetto da Difetti del Tubo Neurale (DTN) il rischio di DTN è:

- a) 1 su 30 nati
- b) Non è valutabile
- c) 1 su 40/50 nati
- d) 1 su 75 nati

9 - Per la rilevazione dei fattori di rischio psicosociali e di depressione post-partum (domande di Whooley), durante un colloquio i "segnacontesto" sono:

- a) Modalità per motivare la legittimità di alcune domande che possono apparire inopportune
- b) Modalità per introdurre domande che possono apparire non pertinenti o fuori contesto
- c) Modalità per indicare in quali contesti un utente è legittimato a porre domande al professionista
- d) a + c

10 - All'interno di un servizio di Procreazione medicalmente assistita (PMA), quali sono le caratteristiche tecnologiche di una sala criobiologica?

- a) Impianto di stoccaggio ed alimentazione azoto, impianto di distribuzione azoto
- b) Controllo accessi
- c) Segnaletica di sicurezza
- d) Tutte le precedenti

11 - L'emivita dell'ossitocina è di:

- a) 30-45 minuti
- b) 6-12 minuti
- c) 60-90 minuti
- d) Nessuna delle precedenti

12 - I dati sensibili sono:

- a) dati anagrafici
- b) dati inerenti lo stato di salute, le abitudini, il credo politico, origine razziale/etnica, convinzioni religiose
- c) dati relativi lo status economico/sociale
- d) nessuna delle precedenti

13 - A quale età si deve iniziare lo screening con Hpv (Human papilloma virus) test?

- a) 25 anni
- b) 30 anni
- c) 35 anni
- d) 22 anni

14 - Alla dimissione di una donna dall'ospedale dopo il parto, è opportuno:

- a) insistere sull'allattamento al seno
- b) sconsigliare l'allattamento artificiale
- c) verificare la presenza di difficoltà rispetto all'allattamento al seno
- d) sulla base di quello che si è osservato in reparto nei giorni di degenza, chiedere o evitare di chiedere come va l'allattamento

15 - Nel momento in cui dobbiamo comunicare anomalie emerse dal test di screening è meglio:

- a) introdurre l'argomento facendo domande su quanto è conosciuto ed è già stato detto alla donna, usando linguaggio e informazioni il più possibile conosciute e famigliari;
- b) non preoccuparsi di fornire ulteriori informazioni ma solo indirizzare la donna dai colleghi più esperti nel campo;
- c) portare esempi di altre situazioni fortunatamente in cui c'è stato solo un "falso allarme" e commentare i risultati rassicurando;
- d) fornire tutte le informazioni sulle nuove ricerche scientifiche anche citando numeri, statistiche e probabilità;

16 - L'indice di Bishop

- a) È il metodo più comunemente usato per la valutazione della cervice uterina
- b) Ha permesso una standardizzazione della valutazione del grado di maturazione cervicale
- c) Prende in considerazione le caratteristiche intrinseche della cervice uterina (lunghezza, posizione, appianamento, consistenza) ed il livello della parte presentata nello scavo pelvico
- d) Tutte le precedenti

17 - La misurazione del liquido amniotico (LA):

- a) È ecografica e si calcola con l'amniotic fluid index (AFI) o con la misurazione della tasca massima di LA (liquido amniotico)
- b) È ecografica e si calcola esclusivamente con l'AFI (amniotic fluid index)
- c) È ecografica e si calcola esclusivamente mediante la misurazione della tasca massima di LA (liquido amniotico)
- d) Nessuna delle precedenti

18 - L'induzione del travaglio di parto è controindicata in caso di:

- a) Pregresso cesareo con incisione longitudinale o altra isterotomia ad alto rischio
- b) Precedente rottura d'utero
- c) Placenta previa o vasa previa
- d) Tutte le precedenti

19 - L'esercizio fisico in gravidanza è controindicato:

- a) In caso di incontinenza cervicale e/o cerchiaggio cervicale
- b) Gravidanze multiple a rischio di parto pretermine
- c) Placenta previa oltre le 26 settimane di gestazione
- d) Tutte le precedenti

20 - Le principali manifestazioni del distacco intempestivo di placenta sono rappresentate da:

- a) Sanguinamento vaginale e dolore addominale
- b) Tachisistolia e pattern cardiotocografici non rassicuranti
- c) Nessuna delle precedenti
- d) Sia a) che b) sono corrette

21 - La sorveglianza del benessere materno-fetale nella paziente che pianifica il TOLAC (travaglio di prova dopo taglio cesareo):

- a) Prevede l'auscultazione intermittente nel I stadio del travaglio di parto
- b) Prevede la registrazione cardiotocografica in continuo
- c) L'immersione in acqua è assolutamente controindicata
- d) L'analgesia è controindicata in quanto costituisce un fattore di rischio causale per l'insuccesso del TOLAC (travaglio di prova dopo taglio cesareo) inoltre maschera eventuali sintomi e segni di rottura d'utero

22 - Le prove urodinamiche nella paziente con prolasso genitale:

- a) sono inutili
- b) sono utili in caso di disfunzioni urinarie, pre-operatoriamente, perché possono orientare il counselling e la scelta di trattamento
- c) sono obbligatorie prima di tutti i tipi di chirurgia del pavimento pelvico
- d) non sono influenzate da una eventuale infezione transitoria delle vie urinarie

23 - Dove viene prodotto il latte materno?

- a) nei seni lattiferi
- b) negli acini
- c) nei dotti galattofori
- d) all'interno della areola

24 - Il biological nurturing richiede che:

- a) la madre sia informata sui riflessi primitivi neonatali e materni
- b) la madre assuma una posizione che permetta l'espressione massima dei riflessi
- c) l'operatore che assiste la madre non interferisca con l'espressione dei riflessi primitivi
- d) tutte le condizioni

25 - Quale tra queste non costituisce una possibilità di invio della donna al secondo livello di colposcopia:

- a) HPV test positivo/PAP test negativo
- b) L-SIL
- c) HPV test positivo persistente >12 mesi/PAP test negativo
- d) ASC-H

26 - Indicare la corretta definizione di sterilizzazione.

- a) Completa distruzione o rimozione di microrganismi e delle spore dai materiali
- b) Rimozione dalla superficie di un oggetto di materiale chimico contaminante
- c) Completa distruzione dei batteri, dei virus, dei miceti, ma non necessariamente delle spore
- d) Inattivazione dei batteri, dei virus, dei miceti, ma non necessariamente delle spore

27 - I cosiddetti "livelli essenziali di assistenza" (LEA), introdotti con il D.Lgs. 502/1992, rappresentano:

- a) i trattamenti sanitari ritenuti appropriati ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica
- b) le attività di prevenzione sanitarie garantite dalle strutture extraospedaliere
- c) la dotazione organica minima di personale sanitario ai fini dell'accreditamento
- d) le prestazioni sanitarie minime da garantire a tutti i cittadini dal Servizio sanitario nazionale

28 - Per ectropion si intende:

- a) La presenza di endometrio in sede ectopica
- b) Una lesione infiammatoria della cervice
- c) Un'eversione della mucosa endocervicale
- d) La presenza di mucosa cervicale in sede ovarica

29 - L'obiettivo di un corso di Accompagnamento alla Nascita è quello di:

- a) Dare informazioni tecniche, indicazioni rigide e precise per ottenere la completa delega della donna
- b) Lanciare forti messaggi (verbali e non) su come si dovrebbe essere, pensare, agire.
- c) Offrire gli strumenti per poter fare scelte consapevoli in un clima il più possibile non giudicante.
- d) Insegnare il metodo RAT (Training Autogeno Respiratorio) come unico strumento del controllo del dolore

30 - Se assunti durante il puerperio i seguenti farmaci passano nel latte materno, ECCETTO?

- a) Acido acetilsalicilico
- b) Eritromicina
- c) Tetracicline
- d) Eparina

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA (CAT. D)
INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**

PROVA SCRITTA N. 3

1 – Durante la gravidanza quali tassi di prevalenza per la nausea sono riportati in letteratura?

- a) Tra il 50% e l'80%
- b) Oltre il 90%
- c) Tra 10% e 20%
- d) Sotto il 3%

2 - Quale dei seguenti valori ormonali è diagnostico di menopausa?

- a) FSH (ormone follicolo stimolante) elevato
- b) Prolattina elevata
- c) Estradiolo basso
- d) Nessuno dei precedenti

3 - Quale di queste affermazioni sulla contraccezione intrauterina è corretta?

- a) In Italia è utilizzata da circa 300.000 donne
- b) Viene utilizzata solo nelle pluripare
- c) È un metodo contraccettivo meno efficace della contraccezione ormonale.
- d) Deve essere inserita non prima di 60 giorni dal parto

4 - Quali di queste affermazioni non è vera sulle MST?

- a) I tassi di prevalenza le collocano fra le più diffuse cause di morbilità nella popolazione in età fertile ed economicamente produttiva (15-49 anni)
- b) Determinano sequele e complicanze, spesso severe, soprattutto a carico dell'apparato genitale femminile
- c) Giocano un ruolo nell'incrementare il rischio di trasmissione dell'HIV
- d) Sono facilmente diagnosticabili perché subito sintomatiche

5 - L'inositolo viene anche chiamato:

- a) Vitamina B9
- b) Vitamina B7
- c) Vitamina B5
- d) È un ormone

6 - I prebiotici: secondo la definizione del ministero della salute sono:

- a) Sostanze non digeribili di origine alimentare
- b) Quando sono assunti in quantità adeguata, favoriscono selettivamente la crescita e l'attività di uno o più batteri già presenti nel tratto intestinale o che vengono assunti insieme al prebiotico
- c) Sono fondamentalmente fibre alimentari solubili che si trovano nella frutta e nella verdura
- d) Tutte le precedenti

7 - L'assorbimento del ferro è favorito da:

- a) Ac. Ascorbico (vit. C)
- b) Colecalciferolo
- c) Vit. E
- d) Vit. B

8 - Quale tra queste affermazioni è esatta?

- a) Il rischio che un feto sia affetto da cromosomopatia aumenta con l'avanzare dell'età materna
- b) La percentuale di aborti aumenta con l'aumentare della età materna.
- c) L'incidenza di aborto spontaneo o morte intrauterina è maggiore nei feti affetti da difetti cromosomici rispetto ai feti normali.
- d) Tutte esatte



Niccolò Pardini
Anna S...

9 - Per la rilevazione dei fattori di rischio psicosociali e di depressione post-partume, le domande di Wooley...

- a) sono un test diagnostico che permette di individuare circa l'100% delle donne con depressione post-partum
- b) sono un test di screening che permette di individuare circa l'80% delle donne a rischio di depressione post-partum
- c) sono un test diagnostico per la depressione post partum solo se somministrate da uno psicologo o psichiatra
- d) non consentono di porre diagnosi di depressione post partum in quanto test di screening

10 - Per una corretta gestione dei rischi in una sala criobiologica quale documento definisce le caratteristiche organizzative, strutturali e tecnologiche che la sala criobiologica deve possedere per garantire il più alto livello di Qualità e Sicurezza delle cellule e tessuti crioconservati finalizzati all'uso clinico e il più alto livello di Sicurezza per il personale addetto?

- a) Manuale per la gestione di un laboratorio di PMA
- b) Le "Linee Guida per la sala criobiologica di un istituto dei tessuti" 2014
- c) Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro"
- d) Nessuna delle precedenti



11 - Il taglio cesareo peri-mortem, in una gravida in arresto cardiaco dopo la 20° settimana di gestazione, deve essere eseguito entro:

- a) 4 minuti
- b) 10 minuti
- c) 15 minuti
- d) 20 minuti

12 - Le donne che hanno una pressione sistolica maggiore o uguale a 160 mmHg necessitano di un trattamento antipertensivo?

- a) No
- b) Si
- c) Solo dopo l'insorgenza di condizioni cliniche sfavorevoli
- d) Solo se presenti edemi agli arti inferiori

13 - Dopo un test HPV (Human Papilloma Virus) primario negativo quale è l'intervallo di tempo di screening?

- a) 2 anni
- b) 5 anni
- c) 3 anni
- d) 1 anno

14 - Gli algoritmi della comunicazione nel sostegno all'allattamento al seno hanno come primo momento quello di:

- a) fornire informazioni
- b) introdurre l'argomento esplicitando l'obiettivo
- c) fare domande esplorative
- d) fornire dati statistici utili per argomentare l'utilità

15 - Quando un professionista deve consigliare alla donna di assumere un farmaco (es: acido folico) pur in assenza di sintomi:

- a) deve richiamare alla ragionevolezza
- b) deve argomentare su tutti i rischi possibili se la donna non aderisce al comportamento richiesto
- c) deve accogliere ed esplorare le eventuali resistenze e accompagnare la donna nella scelta
- d) deve mostrarsi fermo e categorico perchè egli possiede le conoscenze scientifiche

16 - Si definisce fallimento dell'induzione del travaglio di parto:

- a) Qualora non si riesca a raggiungere una fase attiva del travaglio dopo almeno 15 ore di infusione ossitocica e membrane rotte
- b) Qualora non si riesca a raggiungere una fase attiva del travaglio dopo 8 ore di infusione ossitocica e membrane integre
- c) Qualora la donna rifiuti la prosecuzione dell'induzione con ossitocina o un ulteriore ciclo di maturazione cervicale
- d) Nessuna delle precedenti

17 - La scala di Borg:

- a) Può essere utilizzata per prescrivere un programma di allenamento individualizzato nella donna in gravidanza
- b) È una scala di percezione dello sforzo, serve a valutare la percezione soggettiva dello sforzo fisico in relazione all'entità o intensità dello stesso durante l'attività fisica
- c) Sia a) che b) sono corrette
- d) È uno strumento utile per valutare le condizioni di salute del neonato alla nascita

18 - La sorveglianza materno-fetale durante l'induzione del travaglio di parto:

- a) Prevede la sola sorveglianza materno-fetale durante il travaglio attivo
- b) Prevede un solo monitoraggio cardiocografico di 30-60 minuti subito dopo l'applicazione del metodo prescelto per l'induzione
- c) Prevede la valutazione pre-induzione, la valutazione prima dell'insorgenza del travaglio attivo e la sorveglianza materno-fetale durante il travaglio attivo
- d) Prevede un solo monitoraggio cardiocografico di 20-40 minuti subito dopo l'applicazione del metodo prescelto per l'induzione

19 - Placenta previa è una condizione in cui:

- a) La placenta si impianta a meno di 30 mm dall'OUI (orifizio uterino interno)
- b) I villi placentari penetrano nel miometrio senza interessare la sierosa uterina
- c) La placenta viene a trovarsi davanti alla parte presentata, impiantandosi in corrispondenza del SUI ed in particolare a meno di 20 mm dall'OUI (orifizio uterino interno)
- d) I villi placentari aderiscono in modo anomalo al miometrio senza interposizione di decidua tra i due



20 - In caso di EPP (Emorragia Post Partum) con una perdita ematica fino a 1000 ml, dal punto di vista clinico:

- a) Si ha sempre spiccata ipotensione con sudorazione e tachicardia
- b) Non si hanno mai modificazioni pressorie
- c) In genere non si hanno modificazioni pressorie e la paziente può presentare solo palpitazioni e tachicardia
- d) Nessuna delle precedenti

21 - Quali sono gli interventi che riducono il rischio di parto operativo vaginale?

- a) L'adozione della postura eretta o di fianco durante il periodo espulsivo
- b) L'appropriato e mirato utilizzo dell'ossitocina
- c) Il ritardo nelle spinte attive materne fino a quando non insorge il premito irrefrenabile soprattutto in caso di peridurale
- d) Tutte le risposte precedenti

22 - Nella valutazione di una paziente con prolasso genitale, quale fra i seguenti determinanti è di maggiore importanza nel decidere se e come trattare il prolasso?

- a) età
- b) grado di prolasso
- c) compartimento interessato dal prolasso
- d) grado di compromissione della qualità di vita e desiderio della paziente

23 - Quale è l'effetto della secrezione di prolattina in puerperio?

- a) far fuoriuscire il latte
- b) far contrarre l'utero
- c) far accumulare il latte
- d) far produrre il latte

24 - Il principale ruolo per un operatore sanitario che aiuta una mamma ad allattare è:

- a) centrare l'attenzione sul benessere della madre
- b) insegnare alla madre i segni del buon attacco al seno
- c) attaccare il bambino al seno della madre
- d) verificare che la madre conosca le regole del buon attacco

25 - A seguito di una biopsia su guida colposcopica viene diagnosticata una lesione CIN1 ad una donna di 28 anni, l'iter successivo prevede:

- a) Conizzazione con ansa diatermica
- b) Conizzazione con bisturi a lama fredda
- c) HPV test a 12 mesi
- d) PAP test a 12 mesi

26 - I dati sensibili sono:

- a) dati anagrafici
- b) dati inerenti lo stato di salute, le abitudini, il credo politico, origine razziale/etnica, convinzioni religiose
- c) dati relativi lo status economico/sociale
- d) nessuna delle precedenti

27 - L'ostetrica in quanto figura professionale può svolgere in autonomia tutte le attività che le competono?

- a) In quanto professione intellettuale può svolgere in autonomia le attività previste dal proprio Profilo Professionale
- b) Svolge in autonomia solo le attività che il medico di guardia gli permette di attuare.
- c) Solo le Libere Professioniste svolgono in autonomia le attività previste dal Profilo Professionale.
- d) Può svolgere in autonomia alcune attività solo se è assunta in una struttura sanitaria pubblica

28 - L'atteggiamento del feto in utero è:


- a) Il rapporto che le singole parti assumono tra loro
- b) Il rapporto tra il maggior asse fetale e il maggior asse dell'utero
- c) Il rapporto tra gli indici fetali e quelli materni
- d) Il rapporto tra l'indice di presentazione e della sua maggior circonferenza con i vari piani del canale de parto

29 - La diagnosi di mancato impegno della parte presentata si fa:

- a) Dopo 30 minuti che la parte presentata rimane stazionaria ad un determinato livello
- a) Quando l'indice di presentazione anziché ruotare sotto il pube rimane al diametro trasverso o posteriore
- b) Entro un'ora dalla dilatazione completa
- c) Quando si parla di presentazione di vertice con parte presentata asinclinica

30 - Il termine "mobbing" non include:

- a) L'azione emarginante dei colleghi
- b) L'azione ostacolante del Datore di Lavoro nella progressione di carriera
- c) Azioni negative verso un soggetto preciso
- d) Fornire standard professionali agli operatori



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA (CAT. D)
INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**

PROVA SCRITTA N. 4



1 - Quale dei sotto elencati fattori non è un fattore di rischio di diabete gestazionale?

- a) Età > 35 anni
- b) Familiarità 1° grado per diabete tipo 2
- c) Anamnesi di alterazioni glicometaboliche precedenti
- d) Minaccia di aborto

2 - In una donna al terzo mese di gravidanza viene diagnosticata una infezione da toxoplasma in atto. In questo periodo il rischio fetale è:

- a) Molto elevato
- b) Minimo
- c) Morte intrauterina nel 90% dei casi
- d) Parto prematuro nell'80% dei casi

3 - Secondo l'art. 1 della Legge 29 Luglio 1975, n. 405: Istituzione dei consultori familiari, il servizio di assistenza alla famiglia ha come scopi:

- a) La somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte della coppia e del singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti.
- b) La tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento
- c) La divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando metodi e farmaci adatti a ciascun caso.
- d) Tutte le precedenti

4 - Quale di questi fattori di rischio non è ad alta evidenza di associazione con Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)

- a) Età < 25 anni
- b) Dolore addominale
- c) Anticipo dell'età del primo rapporto
- d) Nuovo partner negli ultimi sei mesi

5 - I probiotici a livello vaginale

- a) Producono acido lattico e perossido di idrogeno
- b) Creano un biofilm che esercita un effetto barriera
- c) Tutte le precedenti
- d) Nessuna delle precedenti

6 - Affinché possa essere definito probiotico, un batterio deve:

- a) Deve resistere all'azione digestiva di succo gastrico, enzimi intestinali e sali biliari
- b) Deve essere in grado di aderire alle cellule intestinali e colonizzarle
- c) Essere attivo e vitale a livello intestinale in quantità tale da giustificare gli eventuali effetti benefici osservati in studi di efficacia.
- d) Tutte le precedenti

7 - L'assorbimento del ferro è ostacolato da:

- a) Fitati e tannini
- b) Ac. linoleico
- c) Ac. ascorbico
- d) Nessuna delle precedenti

8 - La sindrome feto-alcologica e caratterizzata da:

- a) Anomalie facciali tipiche
- b) Ritardo di crescita pre e postnatale e ritardo mentale
- c) Disfunzioni cardiache e altre malformazioni
- d) Tutte le precedenti

9 - Per la rilevazione dei fattori di rischio psicosociali e di depressione post-partum (domande di Whooley), le domande che iniziano con "perché?"

- a) possono essere percepite come valutative e/o giudicanti
- b) possono essere percepite come inquisitive/investigative
- c) vanno evitate per non compromettere la qualità del dialogo
- d) a + b

10 - In un servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nella sala criogenetica nell'utilizzare l'azoto serve:

- a) Effettuare le operazioni velocemente
- b) Mettersi sempre vicino al criocontenitore
- c) Effettuare tutte le operazioni lentamente
- d) Nessuna delle precedenti è esatta

11 - Tra le regole fondamentali per migliorare la sicurezza del paziente ospedalizzato si ritrova:

- a) L'introduzione di sistemi premianti per il personale sanitario
- b) L'adozione di un foglio unico di terapia
- c) La formazione del personale sui temi del governo clinico
- d) L'adozione di organismi di controllo del governo economico

12 - Il ciclo circadiano:

- a) è un poema epico che ha come protagonista l'eroe greco Circeio
- b) è il ciclo che scandisce i ritmi biologici dell'organismo nell'arco della giornata
- c) è uno dei termini con cui viene indicata la sindrome da stress
- d) nessuna delle precedenti

13 - Le donne positive al test HPV (Human Papilloma Virus) primario devono essere inviate direttamente a colposcopia?

- a) Sì
- b) No
- c) Solo se hanno meno di 30 anni
- d) Solo se hanno avuto rapporti a rischio

14 - Per migliorare l'efficacia nel sostegno all'allattamento il professionista:

- a) individua la fase in cui la donna è rispetto all'allattamento
- b) dà tutte le informazioni
- c) non dà informazioni e aspetta che sia la donna a chiederle
- d) nessuna delle domande precedenti

15 - Per costruire una relazione buona abbastanza con la paziente e i familiari, è importante al momento di dare una cattiva notizia:

- a) non cercare giustificazioni
- b) non esprimere le proprie emozioni
- c) riempire i silenzi imbarazzanti con parole
- d) esprimere senza filtri la propria compassione

16 - In caso di tampone vagino-rettale sconosciuto:

- a) Lo si considera sempre come positivo
- b) Lo si considera sempre come negativo
- c) Si valutano eventuali fattori di rischio (febbre >38°C, PROM>18 ore, colonizzazione materna da Streptococco Beta emolitico di gruppo B (SGB) nella precedente gravidanza e urinocoltura positiva per SGB) che possano far considerare la donna come potenzialmente positiva
- d) È sempre opportuna la profilassi antibiotica

17 - Nelle gravidanze con diabete gestazionale in trattamento dietetico ben compensato:

- a) Non è raccomandata l'induzione del travaglio di parto
- b) È raccomandata l'induzione del travaglio di parto tra 38 e 39 settimane di gestazione
- c) È raccomandato offrire l'induzione del travaglio di parto non prima delle 39 settimane e non oltre le 41 settimane di gestazione
- d) È raccomandata l'induzione del travaglio di parto dalla 37° settimana di gestazione

18 - La gravidanza comporta delle modificazioni anatomiche e fisiologiche quali:

- a) Aumento del volume plasmatico, della ventilazione polmonare, della frequenza e gittata cardiaca
- b) Aumento ponderale e modificazione del baricentro con conseguente lordosi
- c) Riduzione del volume plasmatico, della ventilazione polmonare, della frequenza e della gittata cardiaca
- d) Sia a) che b) sono corrette

19 - La placenta previa:

- a) Rappresenta una controindicazione assoluta al parto per via vaginale
- b) Deve essere sospettata quando una gravida si presenta con sanguinamento genitale dopo le 20 settimane di gestazione
- c) È un importante fattore di rischio per emorragia post-partum con eventuale necessità di emotrasfusione ed isterectomia
- d) Tutte le risposte sono corrette

20 - L'indice di shock ostetrico:

- a) Può essere calcolato facendo il rapporto tra frequenza cardiaca e la pressione arteriosa sistolica
- b) In gravidanza è normale tra 0.7 e 0.9 ma non è affidabile in caso di disordini ipertensivi e preeclampsia
- c) In caso di EPP (Emorragia Post Partum) è considerato un indicatore di gravità clinica
- d) Tutte le precedenti

21 -Le controindicazioni al parto operativo vaginale sono:

- a) Dilatazione cervicale non completa
- b) Epoca gestazionale < 32 settimane per il maggior rischio di emorragie subgaleali e traumi dello scalpo fetale
- c) Parte presentata non impegnata e non di vertice
- d) Tutte le risposte precedenti

22 - Quale fra i seguenti esami strumentali è più utile sempre da proporre alla paziente con endometriosi?

- a) la TAC con mdc
- b) l'ecografia ginecologica transvaginale
- c) la RMN con contrasto
- d) l'isteroscopia

23 - Il riflesso ossitocinico può provocare TUTTI i seguenti fenomeni ECCETTO uno:

- a) stimola la contrazione uterina
- b) aumento il senso di sete
- c) aumenta la produzione di latte
- d) causa la fuoriuscita del latte

24 - È corretto affermare che:

- a) Il contenuto di grassi e zuccheri nella poppata dipende dalla alimentazione materna
- b) Nella stessa poppata il latte mantiene invariato le sue componenti
- c) Nella stessa poppata l'ultimo latte contiene più grassi del primo
- d) Nella stessa poppata, l'ultimo latte contiene meno grassi del primo

25 - Per favorire il mantenimento del peso, una gravida obesa dovrebbe:

- a) ridurre fortemente i carboidrati
- b) aumentare la quota proteica
- c) limitare l'apporto energetico mantenendo un equilibrio tra i nutrienti
- d) aumentare i liquidi nella giornata

26 - Per sterilizzazione si intende:

- a) Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
- b) Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
- c) Un processo che permette l'uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, miceti, spora e virus)
- d) La deterzione eseguita mediante l'uso di saponi liquidi ad alto potere detergente

27 - Quali sono gli organi dell'Ordine delle Ostetriche?

- a) Presidente della Federazione nazionale degli Ordini, assemblea delle presidenti degli Ordini, revisori dei conti, tesoriere, consigliere
- b) L'assemblea degli iscritti nell'anno - il consiglio direttivo - il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, consigliere - il collegio dei revisori dei conti
- c) Segretario verbalizzante, presidente, tesoriere, consigliere, collegio dei revisori dei conti
- d) Presidente e vicepresidente e assemblea degli iscritti

28 - La sanzione disciplinare che non può essere irrogata a livello aziendale è:

- a) Il rimprovero
- b) La multa
- c) La radiazione dall'albo
- d) Il licenziamento

29 - La richiesta di Interruzione Volontaria di Gravidanza da parte di una minorenne:

- a) È posta dall'interessata e necessita dell'assenso dei genitori o del tutore
- b) Deve essere sottoposta al Giudice Tutelare
- c) È vincolata all'autorizzazione del Giudice Tutelare
- d) È vincolata all'autorizzazione dei genitori

30 - L'ematemesi indica:

- a) la rottura di capillari nelle cavità nasali
- b) l'emorragia rettale massiva
- c) la presenza di sangue occulto nelle feci
- d) un episodio di vomito con presenza di sangue.