

VACCINO ANTIPOLIOMIELITE

CHE COS'È LA POLIOMIELITE?

La poliomielite (polio) è una malattia virale altamente contagiosa che può provocare paralisi permanente e talvolta la morte. Il virus si trasmette per contatto inter-umano, per via oro-fecale e oro-orale. Nella maggior parte dei casi l'infezione è asintomatica e solo una su duecento, trecento persone infette sviluppa la grave forma paralitica della malattia. Le infezioni da poliovirus asintomatiche in genere si risolvono senza essere individuate. Tuttavia le persone che hanno contratto l'infezione non paralizzante continuano a eliminare i poliovirus per diverse settimane tramite le feci e dalle membrane mucose della bocca e del naso. Ciò significa che queste persone possono continuare a contagiare altre le quali in seguito potrebbero sviluppare la forma grave della malattia.

COME SI PREVIENE LA POLIOMIELITE?

La prevenzione più efficace è la vaccinazione. Esistono due tipi di vaccino antipolio: il vaccino inattivato (IPV) somministrato per iniezione e il vaccino orale (OPV) somministrato per bocca sotto forma di gocce. Tutti i paesi dell'UE, negli ultimi decenni, hanno abbandonato l'OPV per passare all'IPV.

È inoltre disponibile un unico vaccino anti difterite-tetano-polio.

Il vaccino antipolio prevede 3 dosi: una al tempo 0, la seconda dopo 6-8 settimane, la terza dopo 6-12 mesi dalla prima.

Il vaccino è **controindicato** in caso di grave allergia ai componenti del vaccino, alla neomicina, alla streptomina e alla polimixina B, in caso di reazione allergica grave (anafilassi) ad una precedente dose di vaccino, o nei bambini età < 3 mesi.

E' opportuno rimandare la vaccinazione in presenza di malattie acute febbrili o disturbi generali giudicati importanti dal medico.

Le **reazioni** alla vaccinazioni sono generalmente lievi e di breve durata.

La vaccinazione può essere effettuata presso gli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL ed è prenotabile, senza richiesta del medico curante, presso tutti C.U.P. aziendali (comprese le farmacie).

E' possibile chiedere informazioni al Dipartimento di Sanità Pubblica o segnalare eventi avversi post-vaccinali, telefonando al n. **0532 235294**, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

DOPO AVER ESEGUITO LA VACCINAZIONE SI CONSIGLIA DI ATTENDERE 30 MINUTI CIRCA PRIMA DI ALLONTANARSI