

VACCINAZIONE ANTIRABBICA

CHE COS'È LA RABBIA?

La rabbia è una malattia causata da un virus (*Lyssavirus*). Colpisce animali selvatici e domestici e si può trasmettere all'uomo e ad altri animali attraverso il contatto con saliva di animali malati, quindi attraverso morsi, ferite, graffi, soluzioni di continuo della cute o contatto con mucose anche integre. Il cane, per il ciclo urbano, e la volpe, per il ciclo silvestre, sono attualmente gli animali maggiormente interessati sotto il profilo epidemiologico.

La malattia sviluppa una encefalite: una volta che i sintomi della malattia si manifestano, la rabbia ha ormai già un percorso fatale sia per gli animali che per l'uomo. Senza cure intensive la morte arriva entro una settimana.

Trattamenti e profilassi della rabbia

La prevenzione della malattia nell'uomo si basa sulla vaccinazione preventiva per chi svolge attività professionale "a rischio specifico" (veterinari, guardie forestali, cinovigili, guardie venatorie ecc.) e sul trattamento vaccinale post esposizione, limitato a rare e particolari situazioni di rischio, come l'aggressione da parte di un animale sospetto e sconosciuto. Se l'animale è noto, deve essere sottoposto ad una osservazione di 10 giorni, in modo tale da poter escludere l'esposizione al virus al momento dell'aggressione o esposizione.

CICLO VACCINALE:

Prevenzione: 2 iniezioni da 1 ml ad un mese di intervallo. Se occorre ottenere una immunizzazione rapida si praticheranno tre iniezioni (tempi 0, 7, 21 giorni). Richiamo: dopo un anno.

Post-esposizione (es. morso di cane): 5 dosi di vaccino nei giorni: 0; 3; 7; 14; 28. Il ciclo vaccinale può essere interrotto se l'osservazione del cane si conclude con un esito negativo di rabbia nell'animale.

Controindicazioni: grave allergia a un componente del vaccino o alle proteine dell'uovo e grave reazione a una precedente dose.

Reazioni avverse:

- Locali: dolore lieve con rigonfiamento ed eritema
- Generalizzate: cefalea, nausea, vertigini
- Rare reazioni neurologiche e da immunocomplessi

La vaccinazione può essere effettuata presso gli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL ed è prenotabile, senza richiesta del medico curante, presso tutti C.U.P. aziendali (comprese le farmacie).

E' possibile chiedere informazioni al Dipartimento di Sanità Pubblica o segnalare eventi avversi post-vaccinali, telefonando al n. **0532 235294**, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

DOPO AVER ESEGUITO LA VACCINAZIONE SI CONSIGLIA DI ATTENDERE 30 MINUTI CIRCA PRIMA DI ALLONTANARSI