

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE

INFLUENZA AVIARIA HPAI H7N7 IN PROVINCIA DI FERRARA

PRINCIPALI MISURE SANITARIE NELLE ZONE ISTITUITE
(rev. 19.09.2013)

	COMUNI IN ULTERIORE ZONA DI RESTRIZIONE	COMUNI IN ZONA DI SORVEGLIANZA	COMUNI IN ZONA DI PROTEZIONE
MISURE SANITARIE	BERRA CODIGORO GORO JOLANDA DI SAVOIA LAGOSANTO MASSA FISCAGLIA MESOLA	PORTOMAGGIORE OSTELLATO ARGENTA COMACCHIO MIGLIARINO MIGLIARO TRESIGALLO MASI TORELLO FERRARA A SUD DELLA STRADA STATALE 15 (VIA POMPOSA) E AD EST DELLA STRADA PROVINCIALE "VIA PONTE ASSA" BONDENO RESTANTE TERRITORIO MIRABELLO SANT'AGOSTINO CENTO	BONDENO A SUD DELLA STATALE 496 (VIRGILIANA) E A OVEST DEL PANARO
INVIO volatili vivi e uova dalla Regione Emilia Romagna	VIETATO CON DEROGHE	VIETATO CON DEROGHE	VIETATO CON DEROGHE
Asportazione e spargimento della POLLINA da allevamenti avicoli presenti nelle diverse zone	CONSENTITA CON PRESCRIZIONI	PREVIA AUTORIZZAZIONE SERVIZIO VETERINARIO AUSL	PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE
Confinamento del pollame in LOCALI CHIUSI	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO
ACCASAMENTO di volatili	VIETATO CON DEROGHE	VIETATO CON DEROGHE	VIETATO CON DEROGHE
Invio alla MACELLAZIONE, solo a stabilimenti regionali	PREVIA AUTORIZZAZIONE SERVIZIO VETERINARIO AUSL	PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE	PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE
Invio di CARCASSE di volatili morti in allevamento ad impianti autorizzati	PREVIA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO VETERINARIO AUSL	CONSENTITA CON PRESCRIZIONI	PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE

Invio delle UOVA da consumo ad un centro di imballaggio o ad un impianto di sgusciatura	CONSENTITO IN AMBITO REGIONALE	PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE	PREVIA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
Immissione di SELVAGGINA	VIETATO	VIETATO	VIETATO
Utilizzo di RICHIAMI vivi	VIETATO	VIETATO	VIETATO
Commercio AMBULANTE di pollame	VIETATO	VIETATO	VIETATO

INFORMAZIONI PER GLI ALLEVAMENTI RURALI

Chi detiene pollame per autoconsumo deve sapere che:

- è obbligatorio segnalare all'UO Attività Veterinarie dell'AUSL (0532/205770) eventuali casi di mortalità che coinvolgano contemporaneamente diversi volatili o anche sintomi di malattia che coinvolgano diversi volatili, quali febbre (penne arruffate, occhi chiusi, tendenza a stare fermi, a non alimentarsi), respiro più frequente e a becco aperto, starnuti, tosse, occhi gonfi, diarrea, torcicollo, impossibilità a camminare per paresi-paralisi delle zampe o per problemi di equilibrio, etc.
- il pollame deve essere tenuto in locali chiusi, o, se impossibile, in recinti, dove i volatili non abbiano accesso ad acque libere quali fossi, canali, stagni, maceri, laghetti
- i galliformi (polli, galline, faraone, tacchini) devono essere efficacemente separati dagli anseriformi (anatre e oche)
- l'acqua da bere ed il mangime, le granaglie e ogni altro alimento devono sempre essere somministrati al coperto, dove siano inaccessibili agli uccelli selvatici
- è vietato introdurre nuovi animali nel territorio delle zone protezione, sorveglianza e restrizione.